De natuur in januari (louwmaand) in het Randenbroekerbos,

Birkhoven, de Randmeren, Oostvaardersplassen en de Veluwe.

*De algemeen voorkomende **heggenmus** is geen mus, zoals de huismus. Het is een andere vogelsoort. Toch zien we deze niet zo vaak. Dat komt omdat hij verscholener leeft dan de huismus. Het is een solitaire scharrelaar, die zijn kostje op de grond bij elkaar zoekt, zoals spinnen, insecten en andere kleine diertjes. Op een voedertafel zul je ze niet zo snel zien, wel eronder; voor de restjes.*

Huismus>

*In tegenstelling tot de twee vorige tuinvogels kwam ik laatst deze patrijs tegen. Denkelijk ontsnapt uit een volière. **De Europese steenpatrijs.** Prachtig beest. Later opgehaald door de dierenambulance. Niet schuw dus makkelijk benaderbaar.*

Dassenprent>

Hakketakken. *Takken ontspringen willekeurig in het kernhout van de stam. Hieronder is duidelijk te zien hoe dat eruit ziet. Duidelijk wordt dan ook waarom de (k)noesten in het hout altijd weerbarstig zijn. De vezels lopen behoorlijk dooreen. Wel zijn ze prachtig in een tafelblad bijv.*

De Europese rode eekhoorns *scharrelen in het Randenbroekerbos (A'foort) op zoek naar eten in de taxusbomen. Als een fijnproever wurmde*

hij zich in allerlei bochten om het lekkers te vinden. Hoewel onderdelen van de taxus behoorlijk giftig zijn, vond hij de bessen goed te doen. De pitten zijn zwaar giftig, maar die scheidt hij weer uit, net als de vogels.

Vossen *leggen geregeld hun keutels op een molshoop, graspol, kei of bij een paaltje. Waarschijnlijk omdat hij ze uitzet als geurvlag. Een teken aan andere rekels (mannetjes), dit is mijn (jacht)terrein. Daar kun je een puntje aan zuigen.*

Een mollenrit.

Groot dooiermos

Kapjesvingermos

Korstmossen *zijn een teken van zuivere lucht. Bij luchtverontreiniging zul je ze niet tegenkomen. Gelukkig komen we ze steeds vaker tegen.*

De slobeend *(ook wel lepeleend) heeft een breed gevormde snavel, waarmee zij kunnen slobberen. Zij zuigen water op aan de snavelpunt en persen het er weer uit aan de basis, waarbij voedsel wordt opgevangen door de extra lange lamellen aan de snavelrand. Het voedsel bestaat uit plantaardig en vooral dierlijk plankton en verder slakjes, kreeftachtigen, insectenlarven, zaden en dergelijke. De slobeend is een wintergast. Veel trekken door naar het Zuiden, maar inmiddels verblijven er ook velen bij ons, omdat de winters meestal mild zijn en er dus voldoende voedsel te vinden is.*

♂ ♀



(Foto lamellen van wikipedia) >

Kuifeenden en Tafeleenden *(rode kop) horen tot de groep duikeenden. Zij duiken naar de bodem van de plas, vaart of sloot om daar hun voedsel te vinden.*



♀ ♂

De woerden (mannetjes) wilde eend *kunnen niet wachten op het voorjaar. Arme dames! De blauwe spiegel is een typisch kenmerk van de wilde eend. Ondanks dat we zeggen dat eenden kwaken doen alleen de wilden dit. De rest fluit, kraakt, piept of maakt andere geluiden.*

♀

***Putters** foerageren op resterend zaad van bijv. groet klis en teunisbloem.*

***De boomkruiper** steunt bij het foerageren op de stevige gevorkte staart.*

Klapekster



De klapekster heeft een haaksnavel. Het is een jager. De Latijnse naam (Lanius) betekent letterlijk slager. De foto met de muis is gemaakt op Tenerife. De linker op de Veluwe bij Ermelo. Dit is een typische wintergast.





***De zwarte specht** zien we niet zo vaak, leeft wat verscholener dan de grote bonte specht, in het bos. Heeft net zo'n beitelvormige snavel, waarmee hij een hol uithakt met een ovale ingang. Heeft ook de voor alle spechten kenmerkende rode kap. Bij de man groter dan bij het vrouwtje op de foto.*

De koereiger *komt over de hele wereld voor in warmere streken, maar lijkt nu toch ook ons land te koloniseren. Altijd te vinden rond runderen en herten in het wild. Die zorgen door hun gegraas dat er veel insecten opvliegen, die zijn dan goed de Sjaak! Altijd op de uitkijk!*

De ree *is ook steeds alert! Goed volk.*

Gewoon donsvoetje

Nog enkele winterpaddenstoelen

Grijze buisjeszwam

Speerdistel

Het waterhoentje*, zo gewoon, maar o zo schuw EN prachtig.*

De tuinvogeltelling werd gewaardeerd. "Kaw".

De hazelaar *is een naaktbloeier (bloeit als het blad er nog niet is) en een van eerste bloeiers. De vrouwelijke en mannelijke bloeiwijze staan samen op de linkerfoto. De gele katjes (man) leveren het stuifmeel dat door de wind wordt verspreid en zorgt voor de bevruchting. De rode stempel van de vrouwelijke bloem (3 mm) wordt ermee bestoven. Het stuifmeel is voor degenen die allergisch zijn een grote irritator. Klimaatverandering lijkt de oorzaak te zijn van de steeds hogere temperaturen al vroeg in het jaar. Een zegen of niet?? Dat is de vraag!*

De "warmte" op 11 januari heeft deze ***aardhommelkoningin*** *ook gewekt. Slaperig traag liep zij op zoek naar voedsel. Als dat maar goed gaat.*

De naaktbloeiende jasmijn *ook een vroegbloeier.*

De tuinslak *doet in de winter zijn deur goed dicht.*

De gele trilzwam *houdt juist van de kou.*

Volgende keer meer ***over deze merel.***

Voor de liefhebbers,

wat is < hier te zien?

In de hoop dat de zon zich

vaker laat zien;

Groene groet van Gert